

| L | P | A | 25 | 70 |

LAM MILLON 18, rue du Dr Grenier 25300 Pontarlier

C2-ENR04 Version 1

**Formulaire**  
**Liste des analyses a conditions particulieres de**  
**prelevement**

Date de mise en application : 25/11/2008

Dénomination	Contraintes
<b>Tests sanguins</b>	
Acide urique	A jeûn (impératif)
Albumine	A jeûn (fortement recommandé)
Calcium	A jeûn (impératif)
Cholestérol	A jeûn (impératif)
Cortisol	8 h le matin
Créatinine	A jeûn (fortement recommandé)
Cycle glycémique	8h a jeûn + 10h + 14h + 17h (impératif pour le 1° prélèvement)
Dosage d'un médicament	Juste avant la prise si possible, toujours à la même heure

Electrophorèse des protéines	A jeûn (fortement recommandé)
Enzymes (PAL, Transa)	A jeûn (fortement recommandé)
Fer sérique (+/- saturation)	A jeûn (impératif)
Glycémie	A jeûn (impératif)
Groupe sanguin	2 prises de sang à 2 moments différents
HGPO ou hyperglycémie provoquée per os	à jeun puis 3h au laboratoire après absorption de 1g/kg de glucose avec une prise de sang toutes les 1/2h
Hormones (sauf cortisol)	Le matin
FSH, LH	En fonction du cycle, souvent au 4 <sup>e</sup> jour du cycle
Marqueurs tumoraux	Distance du repas
NFP -VS	Distance du repas
Phosphore	A jeûn, le matin (impératif)
Prolactine	9h45, 1/4h de repos allongé avant la prise de sang
Prolactine poolée	3 prise de sang à 1/4h d'intervalle autour de 10h
Sodium	Distance du repas, le matin
Test au synacthène	8h : une prise de sang précédée de 30 min de repos, puis injection de Synacthène immédiat

	Prélèvement à T+30 mn et T+60 mn
Test de Osullivan	À jeun, prélèvements à To et T60 ou T120 selon le cas (cf. prescription) <b>1 h au laboratoire</b> avec absorption de 50g de glucose (médecins de Besançon) <b>2 h au laboratoire</b> avec absorption de 75g de glucose (médecins de Pontarlier)
TP – INR	Distance du repas
Triglycérides	A jeûn (impératif)
Urée	A jeûn (fortement recommandé)
Vitamine D, PTH	A jeûn (fortement recommandé)
<b>Tests bactériologiques (si possible au laboratoire)</b>	
ECBU	Premières urines du matin Désinfection avec la lingette fournie Premier jet dans les toilettes Acheminement dans les plus brefs délais (conservation à +4°C si 1 ou 2 h)
Parasitologie des selles	Sur 3 jours consécutifs si possible (fiche de renseignement à remplir) Acheminement dans les plus brefs délais (moins d'une heure )
Recherche de sang dans les	Sur 3 prélèvements consécutifs si possible

selles	
Prélèvement urétral	Prélèvement avant 1ere miction au laboratoire Recueil du 1 <sup>er</sup> jet d' urines
Prélèvement vaginal	A réaliser en l'absence de toilette vaginale dans les heures précédant l'examen De préférence en dehors des périodes menstruelles
Spermogramme	<b>Après une éjaculation, abstinence sexuelle de 3 à 5 jours avant l'épreuve</b> Le matin entre 7h30 et 8h30 Désinfection à l'aide de la lingette fournie Recueil <b>obligatoirement au laboratoire</b>
Spermoculture	Désinfection à l'aide de la lingette fournie Recueil <b>obligatoirement au laboratoire</b>